

BIJVANGST VAN DE MEERKOET

A. Meekel

Secondary catch of Coot

The author found *Anodonta cygnea* and *Unio pictorum* on land. The mussels were overgrown with Zebra-mussels *Dreissena polymorpha* and for this reason alone caught by Coot *Fulica atra*. The *Anodonta*'s and *Unio*'s were not eaten.

Tijdens een verzameltocht op de Binnen Liede, een oude veenrivier op de grens van de gemeente Haarlem en de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, vond ik op verschillende plaatsen exemplaren van *Anodonta cygnea* en *Unio pictorum* gedeponneerd op omgevallen rietpollen. Bij nadere bestudering bleken deze door een Meerkoet *Fulica atra* opgedoken te zijn, niet voor de mossels maar voor de aangehechte exemplaren van *Dreissena polymorpha*, welke direct werden gegeten. De *Anodonta*'s en *Unio*'s werden achtergelaten op het riet. Pogingen om het water weer te bereiken waren niet altijd vruchtbaar geweest getuige de vele exemplaren die dood met hun voet naar beneden tussen de stoppels werden aangetroffen.

De mossels waren hier dus een waardeloze bijvangst. Er waren geen opengebroken mossels bij. Dit zou anders zijn geweest op plaatsen die bereikbaar zijn voor Reigers. Daar zouden de mossels opengebroken zijn bij het wijkende gedeelte waar de sifonen uitkomen.

Literatuur

- Mienis, H.K. 1990. Predatie op Zwanemossels door Otters in de Weerribben. Corresp.-blad Ned. Malac. Ver., No. 252: 629.
Mienis, H.K., 1991. Predatie op Zwanemossels door Blauwe reigers in de polder Zeevang. Corresp.-blad Ned. Malac. Ver., No. 263: 907-908.

Adres van de auteur:
Verspronckweg 17
2023 BA Haarlem