

Grutto *Limosa limosa* nieuwe prooi soort voor de Slechtvalk *Falco peregrinus*?

Marc van Houten

Op zaterdag 11 april 2015 was ik broedvogels aan het inventariseren in de Buitenvaart Zuid, een uiterwaard ten westen van rivier de Eem (gemeente Eemnes). Tot mijn verbazing zag ik midden op een grasperceel een Slechtvalk zitten die bezig was een prooi met grote brokken op te eten. Zat er nog een veertje aan een hap dan werd deze met een korte kopbeweging uit de snavel geschud.

De afstand was circa 200 meter, maar zelfs met de telescoop kon ik niet zien wat de prooi soort was. Zo nu en dan deed een Kievit *Vanellus vanellus* een 'plagerige' uitval naar de kroppende Slechtvalk. Na tien minuten was de vogel nog bezig met plukken en eten. Alhoewel nieuwsgierig dwong ik mijzelf geen actie te ondernemen en de natuur z'n gang te laten gaan. Daarom besloot ik mijn telling af te maken en later terug te keren naar de plukplaats. Na anderhalf uur kon ik de locatie eenvoudig terugvinden en herkende ik plukresten van een Grutto (zie foto). De kop nog vrijwel intact en de lange poten onmiskenbaar. Van de rest van de vogel was niet veel over.



Resten van de Grutto nadat de Slechtvalk zijn plukwerk had voltooid, gemeente Eemnes, 11 april 2015 (Marc van Houten). *Plucking of Black-tailed Godwit, a prey of Peregrine Falcon, Eemnes, 11 April 2015.*

Dick Dekker (2010) stelt terecht vast dat er een wezenlijk verschil is tussen een lijst met prooien die men een valk heeft zien vangen en een lijst met prooiresten. Slechtvalken zijn niet vies van aas. Bovendien nemen ze elke kans waar andere roofvogels van hun prooi te beroven. Navraag bij Rob Bijlsma, Dick Dekker en Jan van Dijk en bestudering van relevante literatuur leerde mij dat er nergens wat is geschreven over de Grutto op een Nederlandse prooilijst van de Slechtvalk. Dat is deels verklaarbaar omdat 'vroeger' Slechtvalken vrijwel alleen in het winterhalfjaar in Nederland werden aangetroffen en de periode van overlap dat zowel slechtvalken als grutto's aanwezig waren dan niet groot is. In Sleeswijk-Holstein, een belangrijke deelstaat voor weidevogels in Duitsland, zijn tussen 1996-2003 875 slechtvalkprooien verzameld. Hiertussen zaten 5 Grutto's, 0.57% van het totaal (Robitzky 2010).

Of Nederlandse Grutto's door de toename van broedende Slechtvalken vaker ten prooi zullen vallen, zal afgewacht moeten worden.

Dank aan Rob Bijlsma, Dick Dekker en Jan van Dijk voor hun zoekacties naar prooien van Slechtvalken in de literatuur.

Summary

Houten M. van. 2015. Black-tailed Godwit *Limosa limosa* as prey of Peregrine Falcon *Falco peregrinus*. De Takkeling 23: 171-172.

On 11 April 2015, a plucking Peregrine Falcon was observed in grassland in the central Netherlands. Later observations showed the prey to be a Black-tailed Godwit. Prey lists from Dutch Peregrines so far did not include this species, but Black-tailed Godwits are known as prey of Peregrines in northern Germany.

Literatuur

Dekker D. 2010. Over prooien en prooiresten... De Takkeling 18: 156-158.

Robitzky U. et al. 2010. Zur Ernährung der Wanderfalken *Falco p. peregrinus* in Schleswig-Holstein. Vogelkundliche Berichte zwischen Küste und Binnenland 2: 145-159.

Rockenbach D. 2002. Der Wanderfalk in Deutschland und umliegenden Gebieten. Band 2: Jahresablauf und Brutbiologie, Beringungsergebnisse, Jagdverhalten und Ernährung, Verschiedenes. Verlag C. Hölzinger, Ludwigsburg.

Adres: marc.vanhouten@hotmail.com