



Ijsvogel met driedoornige stekelbaars en rietvoorn (Foto's: Carel van der Sanden)

Vissen inventariseren met behulp van een paartje ijsvogels?

Afgelopen winter kwam ik, in de buurt van mijn woonplaats, een paartje ijsvogels tegen. Ik had mij voorgenomen deze te volgen in het broedseizoen. In maart van dit jaar heb ik ze veel geobserveerd en toch heb ik nog weken nodig gehad om de nestholte te vinden. Zij kozen een slootje uit van hooguit 2,5 meter breed, waar op ongeveer een halve meter boven de waterspiegel in de slootkant een nestholte gegraven werd. De vogels hadden geen rekening gehouden met de verhoging van het waterpeil in de zomer, waardoor de nestholte zich later nog maar amper 15 cm boven de waterspiegel bevond. Gelukkig hielden zij hun woning droog.

Tijdens het broeden bracht het mannetje regelmatig een lekker blankvoorn of rietvoorn naar het vrouwtje. Toen er eenmaal jongen kwamen, werd de prooigrootte daar direct op aangepast. Met name stekelbaarsjes (zowel driedoornig als tiendoornig) kwamen voorbij. Naarmate de tijd vorderde, kregen ze steeds grotere visjes waaronder blankvoorn en rietvoorn. Eenmaal had

het mannetje zelfs een goudvis uit een tuinvijver gevangen. Vele visjes volgden de weg naar de hongerige bekjes van de jonge ijsvogeltjes.

De laatste week voor het uitvliegen miste ik opeens het vrouwtje. Of zij is verongelukt of wellicht al op een nieuw legsel zat, is onbekend. Het was dus aan het mannetje om zijn kroost uiteindelijk groot te brengen. Op 3 juni 2015 kwam hij plotseling met een zonnebaars als prooi naar de jongen toe. Voor de jongen is het allemaal geen probleem: zonnebaars, stekelbaars, goudvis, blankvoorn of rietvoorn, het smaakt blijkbaar allemaal naar vis. Door middel van het volgen van dit paartje ijsvogels, is niet alleen inzicht verkregen in het dieet van deze familie, maar ook van de vissoorten die in de omgeving voorkomen... al is natuurlijk niet exact bekend waar zij vandaan komen.

Carel van der Sanden
www.natuurlijk-erp.nl