

Rivierprik doet zich in de Mark tegoed aan blankvoorn



Rivierprik als bijvangst. (Foto: Jan Snoeys)

Op 16 maart 2014 deed Jan Snoeys van de Baroniesche Hengelaars een bijzonder vangst. Al hengelend in de stadswateren van Breda ving hij een blankvoorn van 30 cm, met daaraan vastgezogen een rivierprik. De rivierprik was 22 cm en

liet na de hengelvangst los van de blankvoorn. De rivierprik kon wel worden vastgelegd op bijgaande foto.

De rivierprik is een deel van zijn leven parasitair. Hij zuigt zich dan, met zijn kaakloze bek, vast op vissen en schraapt met zijn tong huid en spierweefsel van de gastheer. De gastheer houdt daar een litteken aan over, maar overleeft het vaak wel. In de literatuur worden haring-, zalm- en houtingachtigen vaak genoemd als prooisorten voor de rivierprik. Rivierprikken voeden zich op deze manier voornamelijk in zee. In veel mindere mate gebeurt het ook in de zoete binnenwateren nabij de kust. Dat maakt deze waarneming van predatie op een blankvoorn dus bijzonder.

De vindplaats maakt deel uit van het stroomgebied van de Mark. Tot in de jaren zestig kwam er in de bovenlopen van de Mark nog beekprik voor, een soort die nauw verwant is aan de rivierprik. Sindsdien waren er geen waarnemingen van prikken in het beheergebied van Waterschap Brabantse Delta. Door de slechte waterkwaliteit en het verdwijnen van paaiplaatsen (schoon grind in snelstromend water) zijn de prikken verdwenen uit de stroomgebieden van de Mark en de Donge. Het is te voorbarig om te stellen dat er sprake is van de terugkeer van prikken in het Markstroomgebied. Daarvoor maakt deze ene prik nog geen zomer.

Frank Spikmans, Marco Beers & Jan Snoeys

Gladde slang eet hazelworm

Via Bert Kruyntjens ontvingen wij deze twee prachtige foto's van een gladde slang die een hazelworm eet. De foto's zijn genomen door Johan en Lilian van de Beek in hun eigen tuin tegen de helling van de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Een unieke waarneming!



(Foto's: Johan en Lilian van de Beek)

