

er al wel overal kikkervisjes. Het betrof voornamelijk de jongen van de rugstreeppad, maar die staat dan ook bekend als pionier in nieuwe situaties. Maar ook de gewone pad was al aanwezig. Ook zijn er al kikkervisjes van de bruine kikker en de groene kikker gezien. Ook in de twee oudste poelen, aan weerszijde van de Langevelderslag, krioelde het dit jaar al van het jonge leven, ook weer voornamelijk rugstreeppadjes. Zij werden door de extreme hitte in juli helaas slachtoffer van verdroging van die twee poelen. De verwachte verhoging van het grondwater door het nieuwe grondwaterschermb langs de Vogelaardreef moet dat in de toekomst voorkomen.


Ook in de nieuwe duinbeek trad in de zomer verdroging op. En na de hevige regenval in augustus was sprake van inspoeling van de nog verse en kale oevers. Het ZHL heeft in dit najaar nog een en ander aan de kale oevers gecorrigeerd en op enkele plaatsen de duinbeek nog verbreed en uitgediept. Hopelijk zal dit er in de toekomst voor zorgen dat de nieuwe kikker- en paddenpopulaties niet steeds door verdroging vroegtijdig aan hun eind komen.

Toekomst

De nieuwe duinbeek moet samen met de vier nieuwe paddenpoelen in de toekomst voor de padden een goed alternatief vormen voor hun gevaarlijke oversteek naar de sloot aan de overkant van de Vogelaardreef. De twee poelen welke in 2002 bij de Langevelderslag zijn aangelegd, hebben hun bestaansrecht al ruimschoots bewezen. Dit zou in principe de paddenbescherming door wegafzetting overbodig kunnen maken. De toekomst zal het leren. Maar in 2007 gaan we zeker nog door om de padden in het Langeveld een veilige oversteek te geven naar de poldersloten.

De mensen die zich dit jaar met de paddenbescherming hebben beziggehouden zijn Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees en Jopie Erkelens, Theo en Nico van den Berg, Piet van Dijk, Annelies Marijn, Ineke van Dijk, Siem de Haas, Piet Broekhof, Wim Breukers, Jelle van Dijk, Rob Jansson en Jan Jacobs.

Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega's van Wijkbeheer Noordwijk weer bedanken voor het verzorgen van het materiaal in het Langeveld.



Weidevogelbescherming in Noordwijk

Dick Pekelharing

In het weidevogeljaar 2006 is, na de reorganisatie van 2005 die ik kortweg beschreven heb in het septembernummer van de Strandloper, begonnen aan een nieuwe ronde.

De voortzetting van de veldwerkzaamheden is voornamelijk gebeurd op aandringen van de overgebleven leden van de groep.

Dit enthousiasme heb ik niet zomaar (na 10 jaar) naast mij neer kunnen leggen. Daarom heb ik mij laten overhalen om op bescheiden schaal dit mogelijk te maken.

Een van de zaken die niet zo gemakkelijk over te dragen was, is de verslaglegging naar Landschapsbeheer Zuid-Holland van de resultaten middels een computerprogramma.

Nu dit programma na jaren van wijzigingen zo'n beetje was uitgekristalliseerd werd het tijd om dit

te vervangen door een internetsysteem. Mijn voornaamste bemoeienis zal het verzorgen van deze verslaglegging zijn.

En omdat ik dan de beschikking heb over alle cijfers, heb ik besloten om dan ook ieder jaar een verslag voor de Strandloper te maken.

Even wat feiten uit een uitgebreid onderzoek, dat in 2005 is verricht om te achterhalen wat de grootste oorzaken zijn van de teruggang van de weidevogelpopulaties. (H. Schekkerman, W. Teunissen).

En dan speciaal over de invloed van predatie. Hierover waren de meningen altijd nogal scherp verdeeld. Ruwweg aan de ene kant de weidevogelbeschermers die de schuld zochten in de intensivering van het boerenbedrijf. Daarnaast de tegenstanders van deze bewering die vooral de nadruk legden op de predatie, maar dan voornamelijk het oog richtten op de vos. Met als "logische" conclusie, dat deze dus zo veel mogelijk moest worden bejaagd en afgeschoten. Ook onder weidevogelbeschermers waren voorstanders te vinden van het afschieten van de vos.

Maar dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat de zaken echt niet zo eenduidig zijn als werd verondersteld.

Het onderzoek werd als volgt uitgevoerd : in een zestal gebieden werden videocamera's bij de nesten geplaatst.

Tevens werden temperatuursensoren geplaatst in 545 nesten, om te achterhalen of de predatie overdag of 's nachts werd gepleegd.

Op de video's werd 145 keer een geval van predatie vastgelegd. De predatoren bij de zoogdieren waren Vos, Hermelijn, Steenmarter, Bunzing, Egel, Hond en mogelijk Wezel. Bij de vogels werden Kraai, Bruine Kiekendief en Havik betrapt.

Als weidevogelbeschermer sta je wel even te kijken dat als vierde vogel dan de Scholekster wordt genoemd !! (Gezien de grafiek is dit 2 keer in het zelfde gebied het geval geweest, en misschien is het wel dezelfde Scholekster). De bij boeren en jagers nogal in een kwade reuk staande Zwarte Kraai bleek in de predatie echter een zeer kleine rol te spelen. In gebieden waar de Vos voorkomt, wordt door deze wel een grote rol gespeeld. In een van de gebieden waar de Vos niet aanwezig was, werd echter een zelfde grote rol gespeeld door de Hermelijn. Kortom, er is een grote verscheidenheid aan oorzaken, waarbij het soort landschap, verschillende vormen van landbouw en veeteelt, het voorkomen van bepaalde

zoogdieren en het voorkomen van bepaalde vogels allemaal een rol spelen.

De resultaten van dit onderzoek in zes gebieden zijn dus niet representatief voor geheel Nederland.

Tot zover dit vluchtige overzicht. Bovengenoemde waarnemingen gingen dus voornamelijk over predatie van **legsels**!

Volgende keer iets uit dit onderzoek naar de predatie van weidevogel**kuikens**.

Nu nog even over de resultaten van de groep in 2006.

In 2005 waren de resultaten scherp negatief beïnvloed door het feit dat in ons basisgebied de loonwerker voor het bemesten door omstandigheden weken te laat was begonnen. Wel werd keurig om de gemarkeerde nesten heen gemest, maar na deze actie zijn er geen nieuwe legsels meer gevonden.

Werden in 2005 67 nesten gevonden met bekend resultaat, in 2006 is dit gestegen naar 70. Niet echt schokkend zult u wel denken, maar als we de Meerkoeten en de Wilde Eenden van 2005 er even uithalen (resp. 5 en 2), dan krijgen we een stijging van 60 naar 70 te zien. Tevens hadden we voor het eerst in tien jaar een Gele Kwikstaart en ook weer eens een andere eend, nl. een Krakeend. In de Poelpolder werd ook nog een nest van de Brandgans gemeld. (Ik vraag mij echter af of hier geen verwarring met een Canadese Gans in het spel is).

Het resultaat van het afgelopen seizoen (2006) ziet er uit als volgt :

Soort	Aantal nesten	Resultaat		
		Bekend	Uit	Niet uit
Grutto	6	6	6	-
Kievit	51	49	44	5
Tureluur	5	5	5	-
Scholekster	7	7	6	1
Brandgans	1	1	1	-
Krakeend	1	1	1	-
Gele Kwikstaart	1	1	1	-
totaal	72	70	64	6