

De broedvogels in het Hoekgatterduin

Andries Gort en Wim van Leeuwen

Nadat we in de Amsterdamse Waterleidingduinen 10 jaar lang de broedvogels geteld hadden in de Westhoek, kregen we in 2006 de kans om in het vrijgekomen kavel Hoekgatterduin te gaan inventariseren. Dit gebied is wel wat groter dan de Westhoek, maar we vinden het veel mooier door de zeer gevarieerde begroeiing.

Het is ca. 50 ha groot. In het noorden en oosten wordt het begrensd door de Hoekgatterweg, in het zuiden door de Zilker Slag of Joppeweg en in het westen door het Oosterkanaal. Door het gebied lopen enkele druk belopen zandpaden.

Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij kale duinen met veel fraaie stuifgaten. We vinden verspreid over het terrein bosjes van eiken, waarvan het “Amerikaanse bos” aan de noordzijde het grootste is. In deze omgeving vormt een serie Oostenrijkse dennen een mooi contrast met dit fraaie duingebied. Naast Duindoorn, Berken en prachtige Duindoorns staan er met name in de strook langs het Oosterkanaal nog veel Amerikaanse vogelkers (Prunus). Juist in deze strook bevinden zich veel zangvogels.

Ook in het Hoekgatterduin liet het voorjaar erg lang op zich wachten. Alles bleef lang kaal en dor, maar de natuur herstelde zich goed en al spoedig ging het gebied in groen op.

Het is een mooi en gevarieerd gebied met veel soorten vogels, waarbij de begrenzing door het Oosterkanaal van grote invloed is.

Door het goed schoongemaakte kanaal en de hoog opgemaakte kanten hadden de aanwezige watervogels, zoals Knobbelzwaan, Wilde Eend en Kuifeend, niet de gelegenheid een nest te bouwen. Pas laat, toen de biezten boven water kwamen, gingen alleen de Meerkoeten aan de gang. De grote verrassing was wel een paartje Grote Canadese Ganzen met 4 pullen, die in de kanaalkant zaten. Prachtig om deze statige vogels met hun kroost te zien. Ook een paartje Goudvinken en Staartmezen deden ons hart sneller kloppen. Verder noteerden we weer enkele paartjes Roodborsttapuiten en Braamsluipers, twee soorten die daar al jaren niet meer waren gezien.

Opvallend en leuk was het flink in aantal toenemende konijnen. Tweemaal hebben we ook een Vos waargenomen. Aan het gering aantal uitwerpselen van de Vos te zien, denken we dat de populatie van de vos afneemt.

Verspreid over het gebied noteerden we, hoewel niet als broedvogel, de Buizerd, de Havik en de Torenvalk.

We hebben genoten van alles wat er groeide en bloeide.



Heggemus

foto's: Jan Hendriks

Roodborsttapuit

