

Resultaat Derde Zeetelling 10 februari 2008 Wassenaarseslag - Langevelderslag											
tellers	Peter Spieren- burg	Peter Spieren- burg	Peter Spieren- burg Annelies Marijnus	Willem Baalbergen Jan Jacobs Mariska de Graaff	Jelle v.Dijk Jaap en Ruurd Eisenga	Rien Sluijs Leo Schaap	Hans v. Stijn Pel van Hattum	Dick Pas- schier Hein Verkade	Totaal 10- feb 2008	Totaal 4-feb 2007	Totaal 22-jan 2006
teltraject	Wass. Slag- Katwijk	Katwijk Boule- vard	Uit- watering- Noordwijk	Noordwijk Boule- vards	Noord- duinen Duind- slag	Duind- slag- Nora- weg	Nora- Langev- slag	Langev- slag prov- grens			
soorten											
Roodkeelduiker			1	2	1	1	7	14	26	558	2
duiker spec.				1					1		
Fuut	8	56	99	110	37	347	152	140	949	6.114	17.757
Aalscholver	1		3	6		6	9	2	27	103	0
Smient	6	8	16	25			19		74	54	58
Eider									0	4	2
Wintertaling			2				8		10	0	0
Kuifeend	2								2	0	0
Zw. Zeeëend								5	5	74	25
Alk/Zeekoet									0	4	11
Bruinvis						1	2	2	5	9	1
Gew. Zeehond	1			1	1		2	1	6	0	1
Grijze Zeehond								1	1	1	2

Tabel. De getelde aantallen zeevogels en zeezoogdieren in zee tussen de Wassenaarseslag en de provinciegrens.

Opvallende waarnemingen oktober-november 2007

Zangertjes van ver

Dichtstbijzijnde broedgebieden in het oosten van Siberië, overwinteringsgebied nog verder weg in Zuid-Oost Azië. Een Kroonboszanger vloog deze herfst minimaal 7.000 km om terecht te komen in een groenstrook in Rijnsoever, Katwijk, tegenover het huis van Casper Zuyderduyn. En hij werd daar ook opgemerkt door Casper, die als geen ander gespist is op zeldzame loofzangertjes. De dag dat hij ontdekt werd, kwamen er enkele honderden vogelaars op af, verwonderd gadegeslagen door voorbijgangers. Met drie eerdere waarnemingen in Europa ooit, ging het dan ook om een extreem zeldzame dwaalgast. Op weg naar zijn overwinteringsgebied is de Kroonboszanger 90° de verkeerde kant op gevlogen, west in plaats van zuid. Hij is maar door blijven vliegen, om uiteindelijk in onze regio terecht te komen. We zien dit vaker gebeuren bij kleine zangertjes. Pallas' Boszanger en Bladkoning, verwanten van de Kroonboszanger, komen zo met enige regelmaat in Nederland terecht.

Ook hun overwinteringsgebied ligt in Zuid-Oost Azië. Beide soorten zijn deze herfst in ons waarnemingsgebied gezien: op 3 en 7 oktober zat er een Bladkoning in de Coepelduynen en op 8 en 9 december liet een Pallas' Boszanger zich zien op Willem v.d. Bergh. Een rijk seizoen wat betreft zangertjes uit verre streken.

Storm

Een stevige novemberstorm sloeg in het weekend van 11 november de opgeslagen bovenlaag van de zeereep weg. Dit was de 'zaadbank' om na de kustversterking weer een snelle vestiging van Blauwe Zeedistels en andere planten in de zeereep te krijgen. Dezelfde storm leverde ook spectaculaire waarnemingen op vanuit de zeetrekthut, met o.a. Vaal Stormvogeltje, Kleine Burgemeester, Vorkstaartmeeuw en veel, veel Middelste Jagers. Dit bleek de opmaat te zijn voor een novembermaand die voor de zeetrekters veel van de voorafgaande slappe maanden goed maakte. Middelste Jagers werden gezien in aantallen die

deden denken aan het recordjaar 1985, tot tientallen per dag. In tegenstelling tot 1985 ging het nu vrijwel uitsluitend om onvolwassen vogels. Vervolgens volgde een 'stranding' van Kleine Alken. Met storm kunnen deze (vooral de verzwakte dieren) in grote aantallen uit hun overwinteringsgebied in de noordwestelijke Noordzee naar onze kust worden geblazen. Veel van deze vogels overleven het niet. Naast langsvliegende vogels werden op diverse plaatsen ook uitgeputte vogels gevonden, soms ver van het strand. Een aantal keer werd ook een langsvliegende Papegaaiduiker gezien.

En een beetje vorst

In december was er een korte periode met vorst. Dit was genoeg om veel polderslootjes dicht te laten vriezen en de watervogels bijeen te drijven in grote wakken. Het Oosterduinsemeer werd een uitwijkplaats voor vogels die zich normaal verspreid over de sloten in het omliggende gebied bevinden. Vooral de aantallen Wilde Eenden (maximaal 610), Krakeenden (maximaal 496) en Aalscholvers (maximaal 236) liepen flink op. Verder lieten zich op veel plekken IJsvogels zien. Van deze vorstgevoelige soort zijn er meer dan ooit in onze regio en als een deel van het water dichtvriest, kom je ze makkelijker tegen. In totaal waren er zeker rond de 10 vogels in november-december in ons waarnemingsgebied aanwezig: Rijnsoever/Zwarte Pad (1-2), Willem v.d Bergh (1), Nieuw-Leeuwenhorst (1), Oosterduinse Meer/Langeveld (2-3), AWD (3). Inmiddels zijn er ook weer de nodige waarnemingen na de vorstperiode en lijkt het er niet op dat er massale sterfte is opgetreden. Een laatste opvallende gast in de vorstperiode was de Grote Zilverreiger. Inmiddels is dit een vaste overwinteraar in de regio, met bijvoorbeeld een vogel die de hele winter rond het voormalige Vliegkamp Valkenburg en Lentevreugd rondhangt. In de Elspeerpolder

en Polder Hoogeweg blijft de aanwezigheid nog onregelmatig. Met de vorstperiode verschenen er in totaal drie Grote Zilverreigers in het bollenland van de Noordzijdepolder en het Langeveld. Waarschijnlijk zijn dit vogels die niet te ver uit de buurt ergens in Zuid-Holland overwinteren en die wat opgeschoven zijn. In de duinvoet en het aangrenzende bollenland vriezen de slootjes tenslotte later dicht.

Voorjaarsgasten

Met het uitkomen van deze Strandloper staat ook het voorjaar weer voor de deur. Een goed moment om nog even terug te blikken op de aankomst van de voorjaarsgasten vorig jaar. In het overzicht staan de gemiddelde aankomstdata in het Noordwijkse werkgebied over de afgelopen 17 jaar, met daarnaast de vroegste data ooit en de aankomst in 2007. Het overzicht kan ook meteen als formulier worden gebruikt door wie in het voorjaar 2008 de aankomstdata bij wil houden. De gemiddelde aankomstdatum geeft een goed idee wanneer je de verschillende soorten kunt verwachten. De aankomsten in het voorjaar 2007 weken over het algemeen niet veel af van de verwachte data. Een opvallende uitschieter was wel een Boomvalk die al op 25 maart boven de Amsterdamse Waterleidingduinen werd gezien door Jan Jacobs. In het overzicht is goed te zien dat het voorjaar slecht op gang kwam vorig jaar, met in maart tot in begin april koud weer en steeds veel wind. De soorten waarvan de eerste individuen normaal in deze periode aankomen, zoals Tapuit, Boompieper, Gele Kwikstaart waren meest aan de late kant. In de warme aprilmaand die er op volgde zien we juist veel vroege aankomsten, zoals van Nachtegaal, Koekoek en Grasmus. De meimaand was weer slecht, maar de voorhoede van de meeste soorten was op dat moment inmiddels gearriveerd. Spannend hoe het komende voorjaar zal verlopen.



Grote Zilverreiger foto: Jan Hendriks



Kleine Alk foto: Jan Jacobs